

Actitudes del paciente ostomizado

48,8%

Creer haber perdido el atractivo sexual



42,9%

Duermen mal por la noche



43,2%

Han realizado cambios en la dieta



32,2%

Han tenido cambios en su trabajo



27,3%

Cambios en sus hobbies habituales



30,0%

Cambios en los deportes que practicaban



Valoración Enfermería en hospital 8,8

Valoración ET en consulta: 9,4

Avalado por:



Aprobado por:

C.E.I.C. del Área de Burgos y Soria

Estudio U&A

Usos y Actitudes de los pacientes ostomizados



148 centros

Enfermeras Estomaterapéutas




871 pacientes



64%



36%



Tipos de ostomías

68% ostomía definitiva - 32% ostomía temporal


Marcaje del estoma



45,6% no se les realizó el marcaje preoperatorio

Mayor frecuencia de fugas se asocia a la ausencia de marcaje preoperatorio ($p < 0,001$)

Piel periestoma: Escala DET



0 Piel normal ————— 15 Severamente dañada

Valoración Escala DET



2,4 - ileos ($p < 0,0001$)

2,0 - no marcados ($p < 0,0001$)



1,4 - colos / **1,6** uros

1,4 - marcados

Calidad de vida: Stoma QoL

Valoración con Stoma QoL



55,7 - ileos ($p < 0,0001$)

57,0 - no marcados ($p < 0,018$)

54,9 - mujeres ($p < 0,0001$)




57,9 - colos / **60,9** - uros

58,3 - marcados

58,4 - hombres


Stoma QoL según frecuencia de fugas



Los pacientes con fugas frecuentes tienen -9,2 puntos en CdV




% pacientes sin fugas



Con Coloplast menos fugas



Satisfacción con el dispositivo



Pacientes más satisfechos con dispositivos Coloplast

